

CAINELE DUMNEAVOASTRA:



1. ALIMENTATIA

NU ARE VOIE:

- ✓ carne de porc;
- ✓ oase de pui, porc sau miel;
- ✓ prajeli (snitel, carnaciori, carne prajita in ulei, omleta etc.);
- ✓ mezeluri (salam, sunca etc.);
- ✓ branzeturi fermentate (de burduf, branza topita, cascaval etc.);
- ✓ cartofi, varza, mazare, fasole uscata;
- ✓ paine proaspata (de evitat in special painea alba);
- ✓ dulciuri (prajituri, biscuiti, zahar, bomboane, ciocolata etc.);
- ✓ nuci, alune, seminte, fistic;
- ✓ banane, pepene galben dulce, stafide, in general fructe foarte dulci;
- ✓ conserve de uz uman;
- ✓ condimente, sare.

ARE VOIE:

- ✓ 1/3 carne de pasare, pipote, vita (fiarta, gratar) PLUS 1/3 orez, arpacas, paste fainoase sau mamaliga PLUS 1/3 legume si fructe (morcovi, telina, pastarnac, dovlecei, salata, rosii, ardei, crude sau fierte, mere, pere, struguri albi -foarte rar)
- ✓ branza de vaci, cas, urda etc., telemea desarata;
- ✓ iaurt, orez sau gris cu lapte cu putina miere, **NU zahar!** (atentie, mierea este laxativa), lapte cu musli sau fulgi de porumb (in principiu, nu lapte simplu);
- ✓ 1-2 galbenusuri de ou (crude sau ochi romanesc fiert in apa) pe saptamana;
- ✓ paine prajita sau veche (nu mucegaita), biscuiti simpli (Popular);

(Exemple: supa sau ciorba cu carne, orez, diferite legume permise; mamaliga cu ou, branza si iaurt; mar ras cu branză de vaci si putina miere.)

✓ hrana speciala din comert (conserve, hrana uscata) in functie de varsta (junior sau adult), greutate si starea de sanatate (ex. pentru probleme urinare, dermatite, femele gestante, caini obezi etc.).

2. ATENTIE LA:

- ✓ carnea tocata speciala pentru caini (pachetele pot contine resturi indigeste- ciocuri, gheare etc);
- ✓ conserve;
- ✓ alimente alergogene precum unt(nu mai mult de 50g pe saptamana), capsuni etc.;
- ✓ numarul meselor pe zi (pui- una la doua ore, se raresc progresiv pana la 1-2 mese /zi la adult);
- ✓ **Interzis "Cersitul" intre mese.**
- ✓ APA de baut trebuie sa fie la discretie si mereu proaspata!

La rasele de talie mare si foarte mare (dog, doberman, mastino etc.), se dau chiar si la adulti, 2-3 mese pe zi si **obligatoriu** se lasa linistiti dupa masa (daca mananca mult o data si se agita, se joaca, alearga etc., exista risc major de torsiune gastrica -**urgenta chirurgicala!**)

3. IGIENA

Cand vorbim de igiena ne referim la toate actiunile intreprinse in vederea mentinerii sanatatii animalului. Noi ne vom limita aici numai la referiri despre spalare, pieptanat si periat dupa caz, taiat unghii, toaleta auriculara, vedere glande perianale. De la inceput specificam proprietarilor ca animalului nu i se va face baie generala pana cand vaccinarea nu va fi completa. Pana atunci poate fi spalare pe botic, pe labute, la fundulet si in jurul organelor genitale.

Pentru spalare se va folosi intotdeauna un sampon special. In orice caz nu folositi orice fel de produs deoarece pielea si parul cainelui pot fi mai sensibile chiar decat ale dumneavoastra. Noi recomandam o baie generala la doua-trei luni. La baie trebuie avut grija sa nu intre apa in urechi (eventual se pun dopuri de vata). Recomandam, de asemenea, ca animalul sa fie spalare pe labute si in zona genituala, ori de cate ori se vine cu el de la plimbare si mai ales cand vremea de afara implica ploaie, umezeala sau noroi. Rasele de caini cu par lung trebuiesc pieptanate si periate zilnic insistand mai ales asupra parului de la urechi, incheieturi si coada. Cainii din cadrul acestor rase trebuie obisnuiti de mici sa fie pieptanati si periat.

4. SUPLIMENTUL DE CALCIU SI VITAMINE

In primele luni de viata, puii de caini, indiferent de rasa, au o rata de crestere foarte rapida, astfel incat de cele mai multe ori calciul si vitaminele din alimentatie nu sunt suficiente pentru necesarul organismului. In functie de talie, pana la o anumita varsta se vor administra suplimente de calciu si vitamine speciale pentru animale. Dupa aceasta perioada critica se vor administra vitamine si minerale de intretinere, de asemenea speciale pentru animale.

5. DEPARAZITAREA INTERNA SI EXTERNA

Endo- si ectoparazitii reprezinta un factor de risc atat pentru animale cat si pentru om de aceea , este absolute necesar ca animalul dumneavoastra sa fie deparazitat intern si extern nu numai la nevoie ci si preventiv.

Prima deparazitare interna se face la varsta de patru-cinci saptamani. Aceasta se va repeta in functie de produs si greutate dupa sfatul medicului veterinar. In general, medicul veterinar, in functie de conditiile date stabileste schema de deparazitare. Aceasta difera de la un animal la altul in functie de:

- ✓ mediul de unde provine animalul si felul in care a fost intretinut;
- ✓ deparazitările efectuate pana in momentul achizitionarii;
- ✓ mediul in care traieste animalul (in apartament sau la curte, in colectivitati de mai multe animale sau singur);
- ✓ educatia cainelui (mananca resturi alimentare de pe afara) etc.;

Deparazitarea interna nu se face cu orice produs. Medicul veterinar stabileste ce produs este mai adecvat, dupa caz.

In ceea ce priveste deparazitarea externa, stapanul trebuie sa previna in permanenta ectoparazitismul. Ectoparazitii (puricii, capusele, paduchii) produc disconfort animalelor, determina aparitia bolilor de piele, transmit boli infectioase si parazitare etc. Se vor folosi in acest sens numai produsele speciale existente in farmaciile veterinare si recomandate de catre medicul veterinar (pipete cu solutii antiparazitare, prafuri si spray-uri antiparazitare). Deasemenea, folosirea zgarzilor antiparazitare este foarte indicata si utila dar numai dupa ce animalul a fost deparazitat inainte cu produsele mai sus mentionate. Puilor in varsta de pana la 3 luni nu li se recomanda purtarea de zgarzi antiparazitare.

6. VACCINAREA

In primele luni de viata vaccinarea este cel mai important aspect in ceea ce priveste sanatatea animalului. Vaccinurile sunt produse injectabile speciale ,care confera rezistenta animalului impotriva unor boli foarte grave, chiar incurabile.

ATENTIE! A nu se confunda orice injectie cu un vaccin.

Dupa caz, medicul veterinar va stabili pentru animalul respectiv o schema de vaccinare. In primul an de viata se fac mai multe vaccinuri apoi, anual, un vaccin

polivalent. Vaccinurile sunt indicate la orice caine, indiferent de varsta, rasa sau sex.

ATENȚIE! Nu se fac vaccinuri animalelor bolnave.

În general, primul vaccin se face la vârsta de 6 săptămâni după o deparazitare prealabilă. Acest vaccin, în funcție de condițiile epidemiologice din zonă trebuie să asigure imunitate împotriva bolilor: Parvoviroza, Coronaviroza și eventual Caree (Distemper, jigodie).

Al doilea vaccin se va face în funcție de tipul de vaccin folosit la prima vaccinare la un interval de 2-3 săptămâni. Acesta va consolida imunitatea pentru Parvoviroza și Coronaviroza și va asigura imunitatea pentru Caree (Distemper, jigodie), Hepatita infectioasă, Leptospiroza și eventual Parainfluență.

Al treilea vaccin se va face, de asemenea, la un interval de 2 sau 3 săptămâni și va consolida imunitatea pentru: Parvoviroza, Caree (Distemper, jigodie), Hepatita infectioasă, Leptospiroza, Parainfluență și dacă animalul a împlinit vârsta de 3 luni se va face și vaccinul ANTIRABIC. Pe perioada vaccinării stăpânul va avea grijă ca animalul să nu intre în contact cu alte animale, chiar dacă sunt sanatoase și să nu fie scos în afara habitatului său.

ATENȚIONAM proprietarii să nu țină animale nevaccinate într-un mediu în care a stat un animal care a avut o boală infectioasă!

**Autor: Dr. Laura Parvan
Medic Veterinar**

MediVet Buftea
Blv. Mihai Eminescu, Nr. 36
Tel. 0311 073 575
contact@bufteavet.ro
www.bufteavet.ro

Aveti dreptul de a copia, stoca, multiplica si distribui acest document in scopuri non-comerciale. Nu aveti dreptul de a modifica sau adapta in niciun fel acest document.